

MARCADORES SOROLÓGICOS INDICADOS PARA
TRIAGEM DAS HEPATITES B E C

Hepatite B: AgHBs e anti HBc.

Hepatite C : anti HCV

Pacientes encaminhados de Bancos de Sangue deverão ter seus marcadores de triagem repetidos.

INTERPRETAÇÃO DOS MARCADORES SOROLÓGICOS DE TRIAGEM

HEPATITE B

MARCADORES RESULTADO	INTERPRETAÇÃO	CONDUTA
AgHBs REAGENTE e Anti HBc REAGENTE	- Hepatite aguda (ou) - Hepatite crônica	Encaminhar para acompanhamento na Unidade de Referência
AgHBs REAGENTE e Anti HBc NÃO REAGENTE	- Falso positivo (ou) - Início da fase aguda	Colher 2ª amostra e repetir os dois marcadores: - persistindo a positividade , encaminhar para acompanhamento na Unidade de referência; - se o resultado for não reagente – ALTA com orientação sobre prevenção.
AgHBs NÃO REAGENTE e Anti HBc REAGENTE	- Falso positivo (ou) - Janela imunológica (ou) - Cura	Repetir anti HBc e solicitar anti HBs (ver quadro 1).
AgHBs NÃO REAGENTE e Anti HBc NÃO REAGENTE	- Indivíduo suscetível	Encaminhar para vacinação na rede pública, se pertencer a um dos grupos de risco acrescido.

QUADRO 1

MARCADORES RESULTADO	INTERPRETAÇÃO	CONDUTA
anti HBc REAGENTE e anti HBs REAGENTE	Cicatriz sorológica = CURA	Alta
anti HBc REAGENTE e anti HBs NÃO REAGENTE	Repetir após 3 meses se persistir resultados, repetir novamente após 3 meses se mantiver resultado: pode ser infecção oculta (rara)	Encaminhar para Unidade de Referência

OBSERVAÇÃO: investigar, sempre, todos os comunicantes em quaisquer das situações acima.

INTERPRETAÇÃO DOS MARCADORES SOROLÓGICOS DE TRIAGEM

HEPATITE C

MARCADORES RESULTADO	INTERPRETAÇÃO	CONDUTA
anti HCV REAGENTE	- Hepatite aguda (ou) - Hepatite crônica (ou) - Cura	Encaminhar para acompanhamento na Unidade de Referência
anti HCV NÃO REAGENTE	Indivíduo suscetível	

- Todos os indivíduos deverão ser orientados quanto às maneiras de transmissão e prevenção da hepatite C.
- Investigar os comunicantes de todos os indivíduos com marcador sorológico reagente.