

Gripe tem tratamento

DEVEM SER TRATADOS IMEDIATAMENTE COM FOSFATO DE OSELTAMIVIR (TAMIFLU®) OS PACIENTES COM:

1. SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):

indivíduos de qualquer idade, com Síndrome Gripal¹ e que apresentem dispneia ou os seguintes sinais:

- Saturação de SpO₂ menor que 95% em ar ambiente;
- Desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória;
- Piora nas condições clínicas de doença de base;
- Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente.

Em crianças, observar também: batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

2. SÍNDROME GRIPAL¹ E QUE:

- Sejam gestantes em qualquer idade gestacional ou puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal);
- Tenham doença crônica, especialmente doença respiratória crônica, cardiopatia, obesidade (IMC \geq 40), diabetes descompensado, Síndrome de Down ou imunodepressão;
- Tenham 60 anos ou mais;
- Sejam crianças com menos de dois anos;
- Sejam menores de 19 anos de idade e façam uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de Síndrome de Reye);
- Vivam em população indígena aldeada.

3. SÍNDROME GRIPAL¹ SEM CONDIÇÕES E FATORES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES: A CRITÉRIO MÉDICO.

ATENÇÃO!

- Iniciar o tratamento imediatamente na suspeita clínica, sem necessidade de exame laboratorial ou sintomas de agravamento.
- Monitorar o doente e, diante de agravamento, considerar medidas de suporte, antibioticoterapia e hospitalização.

DROGA	FAIXA ETÁRIA	TRATAMENTO	
Fosfato de Osetamivir (Tamiflu®)	Adulto	75 mg, 12/12h, 5 dias	
	Criança maior de 1 ano de idade	\leq 15 kg	30 mg, 12/12h, 5 dias
		> 15 kg a 23 kg	45 mg, 12/12h, 5 dias
		> 23 kg a 40 kg	60 mg, 12/12h, 5 dias
		> 40 kg	75 mg, 12/12h, 5 dias
	Criança menor de 1 ano de idade	< 3 meses	12 mg, 12/12h, 5 dias
		3 a 5 meses	20 mg, 12/12h, 5 dias
6 a 11 meses		25 mg, 12/12h, 5 dias	

¹SÍNDROME GRIPAL: indivíduos que apresentem febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia.

Obs.: Em crianças com menos de dois anos de idade: febre de início súbito, mesmo que referida, e sintomas respiratórios.

**O medicamento para gripe é fornecido gratuitamente pelo SUS.
O receituário simples deve ser utilizado para a prescrição do medicamento.**