



Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo 2018

O Estado de São Paulo juntamente com os Municípios realizará no **período de 4 a 31 de agosto de 2018, a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e contra o Sarampo, tendo como os dias Ds 4 e 18 de agosto**. Nos demais estados federados, o Ministério da Saúde realizará a Campanha Nacional de Vacinação no período de 06 a 31 de agosto de 2018 e o dia D no dia 18 de agosto de 2018. Estas estratégias têm como objetivo manter elevada cobertura vacinal contra a poliomielite e sarampo nos municípios, visando evitar a reintrodução do vírus selvagem da poliomielite, bem como vacinar os menores de cinco anos de idade contra o sarampo e a rubéola, para manter o estado de eliminação dessas doenças no país.

Os dias de mobilização – **DIA D – serão nos dias 04/08/2018 e 18/08/2018**. Nestes dias, todos os Centros de Saúde estarão trabalhando para atender a população que deverá ser imunizada nesta Campanha.

Horário de Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde para Vacinação contra Poliomielite e Sarampo - Campanha:

Sábados dias Ds (04/08/2018 e 18/08/2018):

- Horário de Funcionamento: 08:00h às 17:00h
- Localizações dos Pontos de Vacinação:
 - Acesse a Planilha – Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo – Horário das UBSs - 04/08/2018
 - Acesse a Planilha – Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo – Horário das UBSs -18/08/2018

Durante a semana 06/08/18 a 31/08/18:

- Acesse a Planilha – Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo – Horário das UBSs – Durante a semana de 06/08 a 31/08/18.

Público- Alvo que será contemplado nesta Campanha:

- Crianças de 1 anos a menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias).
- As vacinas serão ofertadas como **estratégia indiscriminada**, ou seja, mesmo que a criança já tenha o esquema vacinal completo esta deverá comparecer na Unidade Básica de Saúde mais próximo para receber uma dose a mais da vacina contra Poliomielite e Sarampo.

Vacinas que serão utilizadas na campanha:

- Vacina Poliomielite Oral (VOP)
- Vacina Tríplice Viral (SCR – Sarampo, Caxumba e Rubéola)



Via de administração:

- A vacina VOP deverá ser administrada via oral
- A vacina SCR deverá ser administrada via subcutânea

Contraindicações VOP:

Não há contraindicações absolutas a administração da VOP, evitando-se, entretanto, a vacinação de crianças nas seguintes situações:

- Crianças com hipersensibilidade conhecida a algum componente da vacina, a exemplo da estreptomicina ou eritromicina;
- Crianças que, no passado, tenham apresentado qualquer reação anormal a esta vacina;
- Crianças imunologicamente deficientes devido a tratamento com imunossuppressores ou de outra forma adquirida ou com deficiência imunológica congênita;
- Crianças com história de paralisia flácida associada à vacina, após dose anterior da vacina poliomielite oral;
- Crianças que estejam em contato hospitalar ou domiciliar com pessoa imunodeprimida.

Precauções SCR:

A administração desta vacina deve ser adiada nas seguintes situações:

- Doenças agudas febris moderadas ou graves - recomenda-se adiar a vacinação até resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença;
- Após uso de imunoglobulina, sangue e derivados a vacinação - deverá ser adiada por 3 a 11 meses, dependendo do hemoderivado e da dose administrada, devido ao possível prejuízo na resposta imunológica;
- As crianças em uso de drogas imunossupressoras ou de biológicos devem ser avaliadas nos CRIE e quando for caso, vaciná-las;
- Crianças em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras devem ser vacinadas com intervalo de pelo menos 1 mês após a suspensão da droga;
- Crianças em uso de quimioterapia antineoplásica só devem ser vacinadas 3 meses após a suspensão do tratamento;
- Transplantados de medula óssea recomenda-se vacinar com intervalo de 12 a 24 meses após o transplante para a primeira dose.

- Alergia ao ovo, mesmo quando grave, **NÃO** contraindica o uso da vacina tríplice viral. Por precaução, crianças com história de anafilaxia (alergia grave) ao ovo devem ser vacinadas em ambiente com condições adequadas de atendimento de urgências/emergências ou nos CRIE.



Contraindicações SCR:

A vacina tríplice viral é contraindicada nas situações listadas a seguir:

- Anafilaxia a dose anterior da vacina;
- Crianças menores 5 anos de idade de com imunodepressão grave (LT-CD4+<15%) por pelo menos 6 meses, ou com sintomatologia grave;

Coordenadoria de Vigilância de Agravos e Doenças